→澄清醫院 CHENG CHING

甲狀腺細針穿刺術

1、什麼是甲狀腺細針穿刺術:

抽取少許甲狀腺細胞來做檢查,穿刺針頭如抽血針頭大,疼痛度一樣。

2、穿刺前注意事項:

- 1.先將頸部項鍊、圍巾移除,勿穿高領衣服,頸部勿 擦粉。
- 2.如有出血傾向或服抗凝血劑應事先告知。
- 3.平躺, 肩下墊一枕頭使頭後仰, 超音波定位後, 用 針抽吸細胞, 抽吸中勿吞口水或亂動避免危險。

3、穿刺後注意事項:

- 1.穿刺後以無菌棉球按壓20分鐘。
- 2.若有異狀應即告知檢查醫師。
- 3.返家後患處如有腫脹、疼痛加劇、聲音改變或呼吸 、吞嚥困難情形應立即至急診就醫。
- 4.返家當天患處勿熱敷或搓揉、避免用力、彎腰低頭、 搬重物或抬高雙手(如晾衣服)。

院 址:台中市台灣大道四段966號(原台中市中港路三段118號)

諮詢專線:(04)24632000分機55144

諮詢時間:星期一~五/上午08:30-12:00;下午13:30-17:30

星期六 / 上午08:30-12:00

網 址:www.ccgh.com.tw 2016/4/12 初版

●澄清醫院

CHENG CHING

甲狀腺細針穿刺術

1、什麼是甲狀腺細針穿刺術:

抽取少許甲狀腺細胞來做檢查,穿刺針頭如抽血針頭大,疼痛度一樣。

2、穿刺前注意事項:

- 1.先將頸部項鍊、圍巾移除,勿穿高領衣服,頸部勿 擦粉。
- 2.如有出血傾向或服抗凝血劑應事先告知。
- 3.平躺, 肩下墊一枕頭使頭後仰, 超音波定位後, 用 針抽吸細胞, 抽吸中勿吞口水或亂動避免危險。

3、穿刺後注意事項:

- 1.穿刺後以無菌棉球按壓20分鐘。
- 2.若有異狀應即告知檢查醫師。
- 3.返家後患處如有腫脹、疼痛加劇、聲音改變或呼吸 、吞嚥困難情形應立即至急診就醫。
- 4.返家當天患處勿熱敷或搓揉、避免用力、彎腰低頭、 搬重物或抬高雙手(如晾衣服)。

院 址:台中市台灣大道四段966號(原台中市中港路三段118號)

諮詢專線:(04)24632000分機55144

諮詢時間:星期一~五/上午08:30-12:00;下午13:30-17:30

星期六 / 上午08:30-12:00

網 址:www.ccgh.com.tw 2016/4/12 初版